



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana

**Prevalencia de esquizofrenia en pacientes dependientes
a sustancias hospitalizados en el servicio de adicciones
del Hospital Hermilio Valdizán durante el periodo
2010 - 2012**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Psiquiatría

AUTOR

Verónica Johana CHUMPITAZ ALVAREZ

Lima, Perú

2013

RESUMEN

La comorbilidad entre un trastorno por uso de sustancias y otros trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia; es conocida como patología dual. Los individuos con esquizofrenia presentan tasas de abuso a sustancias más altas que la población en general. El consumo de sustancias en estos pacientes empeora los síntomas e interfiere con la respuesta terapéutica. Esto tiene gran relevancia por su repercusión clínica y coste asistencial. Esta patología es de difícil diagnóstico y tratamiento, por lo que su abordaje debe ser integral.

El objetivo del presente estudio, busca determinar la prevalencia de esquizofrenia en pacientes dependientes a sustancias psicoactivas; así como describir las características socio demográficas y clínicas.

Se evaluó el diagnóstico de esquizofrenia en 576 historias clínicas de pacientes dependientes a sustancias psicoactivas hospitalizados en el Servicio de Adicciones del Hospital “Hermilio Valdizán”, durante el periodo 2010 al 2012. Se encontró que 451 pacientes (78.30%) presentaban algún tipo de comorbilidad psiquiátrica. De este grupo 52 pacientes (9.03%) cumplían criterios para esquizofrenia y dependencia a sustancia psicoactiva. La edad promedio de éstos fue 26.61 años, el 88.46% eran solteros, 40.38% tenían secundaria completa y el 25% con secundaria incompleta; el 50% eran desempleados. Se encontró que 65.38% tenía su primer hospitalización. La edad de inicio de consumo era menor de 16 años (59.62%); de las cuales 65.38% consumía alcohol. La principal sustancia de abuso fue la marihuana (51.92%), seguido de la PBC (32.69%). La elevada prevalencia de la patología dual y su repercusión asistencial hacen aconsejable disponer de programas terapéuticos especializados para su tratamiento.

PALABRAS CLAVES: Dependencia a sustancias psicoactivas. Comorbilidad. Esquizofrenia.

SUMMARY

The comorbidity between substance use disorders and other psychiatric disorders, such as schizophrenia, is known as dual pathology. Individuals with schizophrenia have substance abuse rates higher than the general population. Substance use in these patients worsens symptoms and interferes with the therapeutic response. This has great relevance for their clinical impact and cost of care. This disease is difficult to diagnose and treatment, so your approach must be comprehensive.

The objective of this study was to determine the prevalence of schizophrenia in patients with psychoactive substances dependence, and to describe the socio demographic and clinical characteristics.

Schizophrenia diagnose was evaluated in 576 clinical histories of patients with dependence to psychoactive substances that were hospitalized on Hermilio Valdizan Hospital's Addiction Service, during the period 2010 to 2012. 451 patients (78.30%) presented psychiatric comorbidity. 52 patients (9.03%) met criteria for schizophrenia and psychoactive substance dependence. Their average age was 26.61 years, 88.46% were single, 40.38% had completed secondary school and 50% were unemployed. It was the first hospitalization of 65.38% of patients. The 59.62% started their consumption before 16 years old, most of them, 65.38%, with alcohol. The main substance of abuse was cannabis (51.92%), followed by cocaine base (32.69%). The high prevalence of dual diagnosis and its impact health care make advisable to have specialized treatment programs for treatment.

KEYWORDS: Psychoactive substances dependence, Comorbidity, Schizophrenia.